

**OPŠTA BOLNICA UŽICE
DEČIJE ODELJENJE**

FEBRILNI NAPAD – UPUTSTVO ZA RODITELJE

•Važno je da znate:

Posle febrilnog napada Vaše dete će biti zdravo.

Febrilni napadi su česta pojava kod dece.

Novi febrilni napadi su vrlo česti i javljaju se kod oko 50% dece.

Febrilni napadi ne prouzrokuju oštećenja mozga ukoliko nisu komplikovani, a nisu ni uzrok mentalne retardacije, niti po sebi ometaju školovanje deteta.

Febrilni napadi nisu epilepsija i vrlo retko dovode do epilepsije.

Vaše dete neće umreti u toku febrilnog napada.

- Vaše dete je imalo febrilni napad, i jako ste uplašeni, ne znate kako da se ponašate pri narednom skoku temperature.
- Napad se može ponoviti pri nekom od ponovnih skokova temperature. Ovo je uputstvo o tome kako da se ponašate u takvoj situaciji.
- Kada Vaše dete ima povišenu temperaturu (>38C) potrebno je da date lek za snižavanje temperature (najčešće su to paracetamol-Paracet, Febricet, Eferalgan, itd., ili ibuprofen-Brufen) koji možete ponoviti nakon 4-6h u dozi koju Vam je lekar propisao ukoliko je temperatura ponovo iznad 38C.
- 15-20 minuta nakon davanja leka za snižavanje temperature istuširajte dete (to možete učiniti i bilo kada u međuvremenu), raskomotite ga, dajte dosta tečnosti. Frikcije alkoholom se ne preporučuju!
- Kada je temperatura iznad 38C dajte i Diasepam rektalno (što Vam je pokazano prethodni put), 5mg.
Lek možete ponoviti na 8 ili 12h ukoliko je temperatura ponovo povišena (kako Vam je lekar savetovao, pročitacete u otpusnoj listi ili izveštaju).

•UKOLIKO SE PONOJNI FEBRILNI NAPAD IPAK DESI:

- budite pribrani
- okrenite dete na bok,
- dajte Diasepam 5mg rektalno,
- ne prskajte, ne otvarajte usta, ne izvlačite jezik, ne stavljajte nikakve predmete u usta,
- ukoliko napad ne prolazi i 15min po davanju Diasepama, pozovite Hitnu pomoć.