



## Incizija i ekstirpacija Bartholinijeve žlezde

Ciste Bartholinijeve žlezde, koja je normalno smeštena u donjoj trećini velikih usana žene, nastaju kao posljedica prethodnih upalnih procesa ili ožiljaka nakon traume, zbog čega dolazi do začepjenja izvodnog kanala žlezde i nakupljanja sekreta.

Sekundarnom bakterijskom infekcijom sekreta nastaje akutna upala (Bartholinitis), koju karakteriše jak bol i crvenilo. U toj fazi moguće je izlječenje primenom antibiotika širokog spektra. Dođe li, međutim, do nakupljanja gnojnog sekreta (apscesa) potrebno je skalpelom napraviti inciziju žlezde i drenažu gnojnog sadržaja. Budući da se opisane upale često znaju ponavljati, uputno je, po smirivanju akutne faze, napraviti konačni hirurški zahvat, a to može biti:

- Marsupijalinizacija, kojom se ivice žlezde evertiraju (izvrnu), te se na taj način postiže trajna drenaža žlezde ili
- Ekstirpacija ili odstranjenje Bartholinijeve žlezde, kroz rez na unutašnjoj strani velike usne.

Zahvat se može izvesti pod opštom anestezijom, a pacijentkinja se otpušta kući sledećeg dana. Poštediti od fizičkih napora tokom sledeće dve do tri nedelje je nužna, zbog mogućnosti krvarenja u operisanom području. Odstranjeni preparat šalje se na patohistološku analizu.